



Tabela de reconstituição de produtos Danone Nutricia.



LINHA ALERGIA



Fórmula infantil e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância, destinada a necessidades dietoterápicas específicas, com 0,6 kcal/mL¹

NEOCATE LCP - PREGOMIN PEPTI
APTAMIL PEPTI HMO

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres- -medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)		
			Neocate LCP 400 g	Pregomin Pepti 400 g	Aptamil Pepti HMO 800 g
30	1	35	86	93	170
60	2	70	43	46	85
90	3	100	28	31	56
120	4	140	21	23	42
150	5	170	17	18	34
180	6	200	14	15	28



Fórmula infantil e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância, destinada a necessidades dietoterápicas específicas com proteína extensamente hidrolisada, com restrição de lactose e com 1 kcal/mL¹

PREGOMIN PLUS

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres- -medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
			400 g
45	2	50	39
90	4	100	19
135	6	150	13
180	8	200	10



Substituto adequado do leite, à base de aminoácidos livres, para crianças que permanecem com APLV, com 1 kcal/mL¹

NEOADVANCE

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres- -medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
			400 g
90	3	105	18
180	6	210	9
240	8	280	6
360	12	420	4



Suplemento infantil à base de aminoácidos livres, para crianças que permanecem com APLV, com 1,27 kcal/mL¹

NEOFORTE (sabor baunilha/morango)

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres- -medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
			400 g
110	5	135	10
180	8	220	6



Mistura para preparo em consistência de colher, à base de aminoácidos livres

NEOSPOON

	Quantidade de água (mL)	Número de colheres- -medida	Quantidade de mingau (g)	Rendimento da lata (porções)
				400 g
6 a 12 meses	50	6	75	14
1 a 3 anos	60	8	97	11

A quantidade de água pode ser alterada para aumentar ou diminuir a consistência, conforme orientação do médico ou nutricionista.

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS FUNCIONAIS (FGIDs)



APTAMIL RR
APTAMIL ESPESADO

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres- -medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)	
			Aptamil RR 800 g	Aptamil Espessado 800 g
30	1	35	170	173
60	2	70	85	86
90	3	100	56	57
120	4	140	42	43
150	5	170	34	34
180	6	200	28	28



APTAMIL SENSITIVE ACTIVE

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres- -medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
			Aptamil Sensitive Active 800g
30	1	35	173
60	2	70	86
90	3	100	57
120	4	140	43
150	5	170	34
180	6	200	28



APTAMIL SL

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres- -medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
			Aptamil SL 800 g
30	1	35	186
60	2	70	93
90	3	100	62
120	4	140	46
150	5	170	37
180	6	200	31

LINHA SOJA



Fórmula infantil e de seguimento à base de proteína de soja

APTAMIL SOJA

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres- -medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
			800 g
30	1	35	173
60	2	70	86
90	3	100	57
120	4	140	43
150	5	170	34
180	6	200	28



Fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância, à base de proteína de soja

APTANUTRI SOJA

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres- -medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
			800 g
90	3	100	62
180	6	200	31
210	7	230	26
420	14	460	13



Pó para preparo de bebida à base de soja para crianças a partir de 3 anos

MILNUTRI SOJA

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres- -medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
			800 g
180	6	200	28
360	12	400	14



APTAMIL DE 0 A 6 MESES

Diluição padrão

1 colher-medida rasa (aprox. 4,6 g de pó) para cada 30 mL de água.

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres-medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
90	3	100	57
120	4	133	43
150	5	165	34
180	6	200	28
210	7	232	24



APTAMIL DE 6 A 12 MESES

Diluição padrão

1 colher-medida rasa (aprox. 5 g de pó) para cada 30 mL de água.

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres-medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
210	7	245	22



APTANUTRI PREMIUM

Diluição padrão

1 colher-medida (aprox. 4,9 g de pó) para cada 30 mL de água.

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres-medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
90	3	100	54
180	6	200	27
210	7	233	23
420	14	466	11



APTANUTRI PROFUTURA

Diluição padrão

1 colher-medida (aprox. 5 g de pó) para cada 30 mL de água.

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres-medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
90	3	100	53
180	6	200	26
210	7	233	22
420	14	466	11



MILNUTRI

Diluição padrão

1 colher-medida (aprox. 5 g de pó) para cada 30 mL de água.

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres-medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
180	6	200	26
360	12	400	13



APTAMIL PRE

Diluição padrão

1 colher-medida rasa de aproximadamente 5,6 g para cada 30 mL de água.

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres-medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
30	1	36	71



APTAMIL PRE TRANSITION

Diluição padrão

1 colher-medida rasa de aproximadamente 4,9 g para cada 30 mL de água.

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres-medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
30	1	35	81
60	2	70	40
90	3	100	27
120	4	140	20



INFATRINI*

Diluição padrão

4 colheres-medida (aprox. 20,4 g de pó) para cada 90 mL de água.

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres-medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
45	2	50	39
90	4	100	19
135	6	150	13
180	8	200	9



FORTINI PLUS 1,5 kcal/mL

Diluição padrão

8 colheres-medida (aprox. 44 g de pó) para cada 100 mL de água.

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres-medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
100	8	130	9
200	16	260	4



FORTINI PLUS 1,0 kcal/mL

Diluição padrão

8 colheres-medida (aprox. 44 g de pó) para cada 100 mL de água.

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres-medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
170	8	200	9
340	16	400	4



FORTINI COMPLETE

Diluição padrão

10 colheres-medida (aprox. 45,6 g de pó) para cada 180 mL de água.

Volume de água previamente fervida (mL)	Número de colheres-medida	Volume final (mL)	Rendimento da lata (porções)
180	10	200	17
360	20	400	8

*A prescrição do médico ou nutricionista deve ser sempre seguida. As tabelas acima podem ser utilizadas como guia de referência.

Olhar que entende, ciência que nutre.



OS PRODUTOS MENCIONADOS NÃO CONTÊM GLÚTEN.

O aleitamento materno é o melhor alimento para os lactentes e, até o 6º mês, deve ser oferecido como fonte exclusiva de alimentação, podendo ser mantido até os dois anos de idade ou mais. As gestantes e nutrizes também precisam ser orientadas sobre a importância de manter uma dieta equilibrada, com todos os nutrientes, e sobre a importância do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais. As mães devem ser alertadas de que o uso de mamadeiras, de bicos e de chupetas pode dificultar o aleitamento materno, particularmente quando se deseja manter ou retornar à amamentação. Seu uso inadequado pode trazer prejuízos à saúde do lactente, além de custos desnecessários. As mães devem estar cientes da importância dos cuidados de higiene e do modo correto do preparo dos substitutos do leite materno para a saúde do bebê. Cabe ao especialista esclarecer previamente às mães quanto aos custos, riscos e impactos sociais dessa substituição para o bebê. É importante que a família tenha uma alimentação equilibrada e que sejam respeitados os hábitos culturais na introdução de alimentos complementares na dieta do lactente, bem como sejam sempre incentivadas as escolhas alimentares saudáveis.

1. Oliveira LCL, Silva LR, Franco JM, Watanabe AS, Pinto Júnior AB, Capelo A, et al. Atualização em Alergia Alimentar 2025: posicionamento conjunto da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e Sociedade Brasileira de Pediatria. Arq Asma Alerg Imunol. 2025;9(1):5-96.

NA IMPOSSIBILIDADE DO ALEITAMENTO MATERNO, AS FÓRMULAS INFANTIS SÃO INDICADAS (SBP, 2018).

Material técnico-científico destinado exclusivamente a profissionais da saúde, obedecendo rigorosamente à Portaria nº 2051/01, à Resolução RDC nº222/02, à Lei 11265/06 e aos Decretos que a regulamentam. Proibida a distribuição a outros públicos e a reprodução total ou parcial. É proibida a atualização deste material para realização de promoção comercial.

ACESSE O SITE

www.danonehealthacademy.com.br

Loja Oficial Danone

11 3095 8482 0800 727 8027

Grande SP Demais localidades

(2ª a 6ª feira, das 8h às 17h)

mundodanone.com.br

DANONE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 701 7561

dac@danone.com